

# SIECIARZ JASKINIOWY

## JAK ROZPOZNAĆ?

Zamiast typowej pajęczyny zobaczysz rozpiętą na ścianie misterną sieć wielkości nawet 25-30 cm. Samice dodatkowo jesienią w pobliżu swoich sieci tkają wydłużone, owalne, białe kokony, w których składają jaja.



Pająki osiągają wielkość nawet do 5 cm wraz z odnóżami krocznymi, na których widoczne są czarne obrączki i liczne czarne kolce. Głowotulów jest błyszczący w rudobrazowym kolorze.



Samica: zaokrąglony, pękaty odwłok o jasnożółtym tle. Ciało dłuższe od samca (do 17 mm)



Samiec: rudobrazowy, owalny odwłok z parą czarnych łatek na przodzie i na tyle ciemnym pasem poprzecznym, odnóża kroczone dłuższe od samicy, długość ciała 10-13 mm



## GDZIE SZUKAĆ ?

Obszar występowania:

- Ojcowski Park Narodowy
- Bieszczady
- województwo dolnośląskie
- bardzo rzadko w centralnej i zachodniej Polsce.



Siedlisko:

- Miejsca wilgotne i ciemne, w których temperatura nie spada poniżej 7 stopni Celsjusza.
- Najchętniej jaskinie, ale także piwnice, kopalnie, stare studnie itp.

## CO JEDZA?



Głównym składnikiem diety są różne bezkręgowce, takie jak wiję, ślimaki, chrzączki, biegaczowate oraz inne pająki. Najchętniej spożywają niewielkie ślimaki, które wpadają do sieci podczas wspinania się po ścianach jaskini lub muru.

## CZY JEST GROŹNY?

Wszystkie pająki są jadowite, a sieciarz jaskiniowy to pająk

**najbardziej jadowity**  
w Polsce.

Jego jad nie jest śmiertelny dla człowieka jednak u osób uczulonych może wystąpić silna reakcja alergiczna.

## UGRYZŁ CIĘ PAJĄK?

- Jeśli masz:
- obok siebie dwa ślady ugryzienia,
  - zaczerwienienie wokół ranki,
  - poczujesz ból jak przy użądleniu przez osę.

Odpowiedź brzmi:  
najprawdopodobniej  
**TAK**

## BEZ PANIKI !!

PAJĄKI NIE PRZENOSZA CHOROŃ.

- w pierwszej kolejności ranę zdezynfekuj
- posmaruj żelem na ukąszenia owadów (dostępnym w aptece bez recepty)
- jeśli pojawi się obrzęk zrób okład chłodzący
- w wypadku silnej reakcji uczuleniowej (duży obrzęk, mocny ból, wysypka, ból lubi zawroty głowy, wymioty) udaj się do szpitala w celu podania surowicy przeciwjadowej.